

Для внутрішнього користування іП "БЭСТ"

Найменування препарату	Тарна одиниця	Культура	Норма витрати, л (кг) / га (т)	Ціна за л (кг), у.о. з ПДВ 100 % передоплата	Аналог
ПРОТРУЙНИКИ					
Конор, в.с.к. Діюча речовина: карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л	20 л	пшениця, ячмінь, кукурудза	2,5 - 3,0	#ЗНАЧ!	Витавакс
Лорд, в.г. Діюча речовина: імідаклоприд, 700 г/кг	0,5 кг	пшениця озима, ріпак ярий та озимий	0,6 - 0,7	39,22	Гаучо
Джагер Плюс, т.к.с. Діюча речовина: тебуконазол, 120 г/л	5 л	пшениця озима та яра, ячмінь ярий	0,2-0,25	7,42	Ракси Ультра
Олдем, т.к.с. Діюча речовина: тебуконазол, 60 г/л + флутриафол, 85 г/л	5 л	пшениця, ячмінь	0,4-0,5	16,01	Томагавк
Хілтон, к.с. Діюча речовина: карбендазим, 500 г/л	5 л	пшениця озима, ячмінь ярий, соняшник	0,5 - 1,0	7,42	Дерозал
ФУНГІЦИДИ					
Тюдор, к.с. Діюча речовина: флутриафол, 250 г/л	5 л	пшениця озима, ячмінь ярий, буряки цукрові, яблуня, виноградники	0,1 - 0,5	10,81	Импакт
Фарадей, в.г. Діюча речовина: тебуконазол, 500 г/кг	1 кг	пшениця озима, ріпак озимий	0,25-0,50	23,32	Ракси Ультра
Хілтон, к.с. Діюча речовина: карбендазим, 500 г/л	5 л	пшениця озима, ячмінь ярий, соняшник	0,8 - 1,2	7,42	Дерозал
Тайлер, з.п. Діюча речовина: металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг	1 кг	пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий, жито озиме, ріпак озимий та ярий, буряки цукрові та кормові	0,3 - 0,6	9,33	Ридомил Голд
ГЕРБИЦИДИ					
Річард, в.р. Діюча речовина: еліфосат у формі ізопропіпаміної солі, 480 г/л	20 л	зернові, соняшник, горох, ріпак, соя	2,0-6,0	3,39	Раундап
Булон, в.р. Діюча речовина: еліфосат у формі калійної солі, 500 г/л	20 л	зернові, соняшник	1,5-4,0	5,19	Ураган Форте
Квін, в.р.к. Діюча речовина: 2,4-Д у формі диметиламінної солі, 344 г/л та дикамба у формі диметиламінної солі, 120 г/л	20 л	пшениця, ячмінь, кукурудза	0,5 - 1,5	7,63	Диален Супер
Ланкастер, к.е. Діюча речовина: ацетохлор, 900 г/л	20 л	кукурудза, соняшник, соя, землі несільськогосподарського призначення	1,5 - 3,0	6,04	Харнес
Грінвіч, в.р. Діюча речовина: бентазон 480 г/л	20 л	горох (на насіння), соя	1,5 - 3,0	13,25	Базагран
Сміт, в.г. Діюча речовина: тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	0,25 кг	озима пшениця, ячмінь ярий, кукурудза	0,01 - 0,02 + ПАР	92,22	Хармони
Вебб, в.г. Діюча речовина: трибенурон-метил, 750 г/кг	0,5 кг	пшениця озима, ячмінь ярий	0,015-0,025	30,74	Гранстар Про
Вільямс, в.г. Діюча речовина: клопіралід, 750 г/кг	1 кг	пшениця, ячмінь, буряки цукрові, ріпак	0,06 - 0,2	55,12	Лонтрел Гранд
Лідс, м.с. Діюча речовина: нікосульфурон, 60 г/л	5 л	кукурудза	0,7-1,0	7,53	Милагра
Енфілд, ке Діюча речовина: пропізохлор, 720 г/л	5 л	кукурудза	2,0-3,0	7,31	Пропонит
Нельсон, к.с. Діюча речовина: прометрин, 500 г/л	20 л	кукурудза, соняшник, картопля	2,0 - 4,0	5,83	Гезагард
Дарвін, к.е. Діюча речовина: клетодим, 120 г/л	10 л	буряки цукрові, соняшник, ріпак, соя	0,4 - 1,8	7,74	Селект
Пул, с.е. Діюча речовина: 2,4-Д-2-етілгексиповий ефір 452,42-г/л+ флорасулам 6,25 г/л	5л	пшениця, ячмінь, кукурудза	0,4 - 0,6	7,21	Прима
Честер, в.г. Діюча речовина: нікосульфурон 500 г/кг	0,5 кг	кукурудза	0,05-0,06+ ПАР	61,48	Торпеда
Шефілд, к.е. Діюча речовина: 2-етилгексиповий ефір 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, 850 г/л, у кислотному еквіваленті – 564 г/л	20 л	пшениця озима, ячмінь ярий, кукурудза	0,6-0,8	6,89	Естерон
Ньюпорт, к.е. Діюча речовина: хізалофоп-П-етил, 125 г/л	10 л	буряки цукрові, соняшник, соя, ріпак ярий та озимий	0,4-1,2	10,81	Миура
ІНСЕКТИЦИДИ ТА АКАРИЦИДИ					
Дуглас к.е. Діюча речовина: диметоат, 400 г/л	10 л	пшениця, ячмінь, буряки цукрові, горох, яблуня, виноградники	0,5 - 3,0	5,25	Би 58
Том, к.е. Діюча речовина: альфа-циперметрин, 100 г/л	5 л	пшениця, буряки цукрові, горох, ріпак, капуста, картопля, яблуня, лісові насадження, землі несільськогосподарського призначення	0,05 - 0,25	7,84	Фостак
Редінг, к.с. Діюча речовина: імідаклоприд, 250 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л	5 л	пшениця озима, ріпак озимий, яблуня	0,1-0,15	20,99	Дестрой
Лорд, в.г. Діюча речовина: імідаклоприд, 700 г/кг	0,5 кг	пшениця озима, ріпак ярий та озимий	0,6 - 0,7	39,22	Конфидор Макс